

INFORMATIVA IN MERITO A RISCHIO DI REAZIONE AVVERSA A MEZZI DI CONTRASTO TC ED RM

In riferimento al documento di consenso SIRM-SIAAIC, Società italiane di radiologia e di allergologia approvato in data 5 dicembre 2017 e recepito dalle società congiunte suddette in data 12 aprile 2018, sulla base della più recente letteratura scientifica e delle Linee Guida Internazionali si precisa quanto segue:

1. Si è confermata la mancata efficacia protettiva della profilassi antiallergica nella prevenzione delle reazioni avverse a mdc, indi per cui

**NON È PIÙ INDICATA LA PREMEDICAZIONE
NEI PAZIENTI CON ALLERGIE**

(ad es: ACARI, CIBI, FARMACI, POLLINI , METALLI ECC....)

2. Nei casi di pazienti con **pregresso episodio di grave reazione allergica a mdc** (shock anafilattico o grave crisi respiratoria) si invia il paz al medico curante con l'indicazione ad eseguire una consulenza allergologica urgente corredata di test cutanei per i singoli mdc noti. Sulla base dei riscontri viene concordemente valutata la reale necessità di sottoporre il paz ad esame con mdc, e si eseguirà l'esame indicato con un mdc chimicamente diverso.
3. Nei pazienti con reazione allergica generica, in atto al momento dell'esame si soprassiede alla infusione del mdc fino a completa risoluzione della sintomatologia, documentata dal curante.

Il responsabile DIM

Dr Duca S.

Il direttore sanitario

Dr Gabbini R.

Firmato in originale